DLP29-0-9001060;

vertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL Régisseur de Recettes de la D.R.A.F. C.C.P. Montpellier 5238-12 G

BULLETIN DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS, DU RAZES ET DE LA PIEGE REDIGE EN COLLABORATION AVEC LES TECHNICIENS DES GVA ET DES COOPERATIVES

N° 28 C DU 25 JUIN 1990

GRANDES CULTURES N°8

PHOMOPSIS DU TOURNESOL

- * Les premiers symptômes de la maladie sont observables. (projections du mois de mai)
- * De nouvelles projections d'ascospores ont été notées dans la semaine du 18 au 23 juin. (protection à réaliser)
 - Parcelles tardives, accessibles avec le tracteur, TRAITEZ dès réception du présent avis.
 - Parcelles au delà du "stade limite passage tracteur". Vous pouvez réaliser la protection soit à l'aide d'un enjambeur si vous pouvez disposer d'un tel matériel, soit par voie aérienne. Consultez à ce sujet votre coopérative.

Les traitements sont à réaliser de préférence avant la pleine floraison du tournesol.

PROTEGEZ VOS CULTURES

1) PARCELLES DEJA TRAITEES :

- a) Si la protection a été réalisée à l'aide de CORBEL ou CORBEL DUO Traitez à l'aide de : PELTAR FLO 7 1/ha ou PUNCII C 0,8 1/ha
- b) Première protection réalisée à l'aide de PELTAR ou de PUNCII C. Choisissez la solution CORBEL ou CORBEL DUO.

2) PARCELLES NON TRAITEES :

- a) accessible avec le tracteur CORBEL ou CORBEL DUO PUNCII C ou PELTAR
- b) voie aérienne PELTAR FLO à 7 1/ha + Huile adjuvante.
- NB Il est déconseillé de traiter deux fois la même culture avec CORBEL ou CORBEL DUO.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



